

➤ PSYCHOSOCIALE ANAMNESE

Hieronder treft u een aantal vragen die de Familietandarts hulp kan bieden in het vaststellen van de eventuele ernst van een angst en/of fobie voor de tandarts.

Kruis het antwoord aan dat voor u het meest van toepassing is.

Ik ben/heb:

Waar Weet ik niet Niet waar

1. In het verleden ernstig ziek geweest
Zo ja, welke;
2. Bang om naar het ziekenhuis te gaan
3. Een handicap
Zo ja, welke; _____
4. Last van duizeligheid of flauwvallen
5. ADHD en gebruik daarvoor medicatie
6. Negatieve ervaring opgelopen bij de vorige tandarts
7. Snel angstig en voor veel dingen bang
8. Bang wanneer ik mijn mond open moet doen bij de tandarts
9. angstig en breekt soms zweet uit wanneer ik in de
wachtkamer van de tandarts wacht
10. Wordt angstig van het geluid van de boor en of andere
tandheeskundige geluiden
11. Bang en schrik bij de dokter, kapper, op geluiden van
apparaten zoals de stofzuiger
12. Vaak driftbuien en/of woede uitbarstingen
13. Gemakkelijk afgeleid, heb moeite met concentratie
14. Zenuwachtig of vastklampend in nieuwe situaties,
en verlies makkelijk zelf vertrouwen
15. Bang/nerveus om naar detandarts te gaan
16. Heeft u extra aanvulling m.b.t. de behandelbaarheid van uzelf: _____

Patiënten sticker

De selectie van de bovenstaande vragenlijst is gebaseerd op de wetenschappelijke psychosociale meetinstrumenten. DAS, SADAS, CFSSDS, DSQ, K-ATB en DPER. Deze meetinstrumenten worden gebruikt voor angst classificatie voor tandheeskundige behandeling.